

## NAVODILO ZA ODVZEM BLATA

---

### PARAZITI V BLATU (ČREVESNI ZAJEDAVCI - GLISTE)


Zajedavci se izločajo z blatom občasno (ciklično) in njihovo število precej niha, zato se priporoča odvzem najmanj treh vzorcev blata, ki se zberejo vsak drugi dan, oziroma v času desetih dni. Na primer: ponedeljek-sreda-petek

Odvzem dveh ali več vzorcev blata v istem dnevu je neustrezen, prav tako je neustrezen odvzem treh vzorcev blata v treh zaporednih dneh.

- Vzorci ne smejo biti kontaminirani z vodo, solmi ali urinom
- Posodico z blatom hranimo na hladnem, pri 4 °C
- Od odvzema do analize ne sme preteči več kot 24 ur.

### Odvzem blata

- oseba naj se iztrebi v čisto posodo (brez primesi detergenta) ali
- v plastično vrečko, ki jo namesti v straniščno školjko (mnogo lažje izvedljivo)
- z žličko odvzame iz različnih delov fekalne mase za lešnik blata ali 1-2 ml tekočega iztrebka



**Za analizo zadošča 1-2 gr (za lešnik) svežega blata;**

**Če je blato tekoče, napolnite 1/4 posodice**

Izvid lahko dobite še isti dan, do 13. ure.

Odlaganje vzorcev blata na okensko poličko v sanitarijah brez vednosti laboratorijskega osebja, in brez predhodnega vpisa v protokol, NI DOVOLJENO!

Teh vzorcev ne analiziramo.