

## ODVZEM PERIANALNEGA ODTISA

Pregled perianalnega odtisa opravimo, kadar sumimo na okužbo z glisto podančico (*Enterobius vermicularis* ali *Oxyuris vermicularis*). Samica tega parazita ponoči leže jajčeca v toplo in vlažno kožo perianalnih gub, kjer se prilepijo na kožo okoli zadnjika. Jajčec v vzorcih blata običajno ne najdemo. Mikroskopski pregled perianalnega odtisa je najustreznejša metoda za dokaz okužbe s parazitom.

Po uporabi odvajal, sredstev proti driski, antibiotikov ter preparatov, ki vsebujejo bizmut, barij ali antacide, se spremeni črevesna flora, zato morate perianalni odtis odvzeti pred terapijo ali en teden po uporabi omenjenih zdravil.

### Navodilo za odvzem

- V laboratoriju dobite objektno steklo. Potrebujete še prozoren selotejp, v dolžini stekelca.
- Zvečer zadnjico umijete in ne mažete s kremo.
- **Odtis odzimate zjutraj pred uriniranjem in iztrebljanjem brez predhodnega umivanja.**
- Selotejp z lepljivo stranjo previdno pritisnite na kožo okoli zadnjika in presredka. Pri tem si lahko pomagata z žličko ali orokavičenim prstom.



© 2004 Marcia Hartsok

- Lepilni trak previdno prilepite na stekelce tako, da med površino stekla in lepilnega traku ni mehurčkov zraka. Pri pravilnem odvzemu boste na stekelcu videli odtis anusa v obliki rozete.



- Pri pripravi odtisa pazite, da se stekelce ne razbije ali lepilni trak ne zmečka.
- **Stekelce z odtisom prinesite čim prej v laboratorij. Delovni čas laboratorija je od ponedeljka do petka od 7. do 12. ure.**
- V primeru nejasnosti pokličite na tel. številko **03 818 37 41**.